Contre l'acidité

INIPOMP®

PANTOPRAZOLE

Une PUISSANCE résolument actuelle

NOUVEAU

INIPOMP® 20 mg

INDICATION CHEZ L'ENFANT À PARTIR DE 12 ANS

DENOMINATION ET COMPOSITION * : INIPOMP® 20 mg et 40 mg comprimé gastro résistant, dosés respectivement à 22,6 mg et 45,1 mg de pantoprazole sodique sesquihydraté correspondant à 20 mg et 40 mg de pantaprazole. Excipients q.s.un comprimé. INIPOMP® 40 mg, poudre pour solution injectable, dosé à 42,30 mg de pantoprazole monosodique anhydre quantité correspondant à 40 mg de pantoprazole. Excipients q.s. un flacon. **INDICATIONS ET POSOLOGIE * : INIPOMP® 20 mg, comprimé - Adultes et enfants de 12 ans et plus :** Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien chez des patients présentant des symptômes typiques (pyrosis, régurgitations acides) et rapprochés (> 1 fois / semaine)**, cicatrisation des œsophagites légères : dose recommandée de 20 mg/jour. La disparition des symptômes est généralement obtenue en 2 à 4 semaines et une durée de traitement de 4 semaines est habituellement nécessaire pour la cicatrisation des lésions d'œsophagite associée. Si cette durée n'est pas suffisante, la cicatrisation sera obtenue en général par un traitement de 4 semaines supplémentaires. Après disparition des symptômes, la prise à la demande de 20 mg/jour, en fonction des besoins, peut prévenir la récidive symptomatique. Si le contrôle des symptômes par le traitement à la demande n'est pas satisfaisant, la reprise d'un traitement continu peut être envisagée. Traitement d'entretien et prévention des récidives des œsophagites par reflux gastro-œsophagien : dose recommandée de 20 mg/jour, avec une augmentation à 40 mg/jour en cas de récidive. INIPOMP® 40 mg peut être utilisé dans ce cas. Après cicatrisation, la dose sera ramenée à 20 mg / jour. **Adultes :** Traitement préventif des ulcères gastro duodénaux induits par les anti-inflammatoires non stéroïdiens non sélectifs (AINS) chez les patients à risque pour lesquels un traitement anti inflammatoire doit être poursuivi (cf. Mises en garde et précautions d'emploi) : 20 mg/jour - CTJ : 0,79 euros (boîte de 14) – 0,77 euros (boîte de 28). *Note* : Chez l'insuffisant hépatique sévère, ne pas dépasser 20 mg / jour. Aucun ajustement de la posologie n'est nécessaire chez le sujet âgé ou chez l'insuffisant rénal. **Enfants de moins de 12 ans :** Les données disponibles étant limitées dans cette tranche d'âge, INIPOMP® 20 mg ne doit pas être administré à l'enfant de moins de 12 ans. **INIPOMP® 40 mg, comprimé :** En association à une bithérapie antibiotique, éradication de *Helicobacter pylori* en cas de maladie ulcéreuse gastro-duodénale : pendant 7 jours, 40 mg matin et soir associé à : - soit clarithromycine 500 mg et amoxicilline 1000 mg, matin et soir, - soit clarithromycine 500 mg et métronidazole ou tinidazole 500 mg, matin et soir, - soit amoxicilline 1000 mg et métronidazole ou tinidazole 500 mg, matin et soir. L'efficacité du traitement dépend du respect du schéma posologique, notamment de la prise de la trithérapie, pendant les 7 jours. Ulcère duodénal évolutif : 40 mg/jour pendant 4 semaines. Ulcère gastrique évolutif : 40 mg/jour, pendant 4 à 8 semaines. Œsophagite par reflux gastro-œsophagien : 40 mg/jour pendant 4 semaines éventuellement reconduit 4 semaines. Traitement au long cours du syndrome de Zollinger-Ellison : posologie initiale : 80 mg/jour puis ajustements. C.T.J. : 1,44 à 1,54 € (1 comprimé) et 2,87 à 3,08 € (2 comprimés). ***Instructions générales :*** Les comprimés dosés à 20 mg et 40 mg ne seront ni croqués ni écrasés, mais avalés entiers avec un peu d'eau avant un repas. **INIPOMP® 40 mg, IV** Traitement antisécrétoire gastrique lorsque la voie orale est impossible. Cas général : 40 mg/jour, par voie intraveineuse. C.T.J. : 8,87 euros Traitement au long cours du syndrome de Zollinger-Ellison : Posologie initiale : 80mg/jour puis ajustements. C.T.J. : 17,74 euros Le traitement par INIPOMP® 40 mg IV sera arrêté dès que le traitement oral est possible et il sera remplacé par INIPOMP® 40 mg comprimé. **CONTRE INDICATIONS :** Hypersensibilité connue au pantoprazole et/ou à l'un des autres composants. Le pantoprazole , comme les autres IPP, ne doit pas être administré avec l'atazanavir (voir rubrique interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions). **MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI * : INTERACTIONS * : GROSSESSE ET ALLAITEMENT * - CONDUITE DES VEHICULES ET UTILISATION DES MACHINES * EFFETS INDESIRABLES * -SURDOSAGE *- PHARMACOLOGIE * :** Inhibiteurs de la pompe à protons. **CONSERVATION :** Pour INIPOMP® 40 mg, IV : conserver le flacon dans son emballage extérieur d'origine, à l'abri de la lumière. **Liste II. AMM ET PRIX INIPOMP® 20 mg, comprimé :** Plaquette thermoformée (aluminium/aluminium) 359 744.1 : Boîte de 14 comprimés – 11,01 euros – Remb.Sec.Soc. 65 % - Coll. -355 844.1 : Boîte de 28 comprimés – 21,50 euros - Remb.Sec.Soc. 65 % - Coll-. 563 750.6 : Boîte de 50 comprimés en doses unitaires – Agrée coll. - Non remboursable dans les indications chez l'enfant de 12 ans et plus à la date du 28 janvier 2008 (demande d'admission à l'étude). **INIPOMP® 40 mg, comprimé :** Plaquette thermoformée (aluminium/aluminium) 344 758.1 : Boîte de 7 comprimés - 10,79 € - Remb.Sec.Soc. 65% -Coll. 355 847.0 : Boîte de 14 comprimés - 21,06 € - Remb.Sec.Soc. 65% -Coll. 355 848.7 : Boîte de 28 comprimés - 40,20 € - Remb.Sec.Soc. 65% -Coll. 559 140.2 : 50 comprimés en doses unitaires – Agrée coll. **INIPOMP® 40 mg,** IV 346 061.8 : Boîte de 1 flacon (verre) de poudre - 8,87 euros - Remb. Séc. Soc. 65% - Coll. **EXPLOITANT** sanofi-aventis France. 1-13 bd Romain Rolland -75014 PARIS. Tél. : 01 57 63 23 23. Information médicale et Pharmacovigilance : Tél. : 0 800 394 000 - Fax : 01 57 62 06 62. **DATE DE REVISION :** Janvier 2008 / V3

*** Pour une information complémentaire, consulter la monographie complète.**

***AFSSAPS, Recommandations de Bonnes pratiques – les antisécrétoires gastriques chez l'Adulte, novembre 2007.*

EDICUS PARIS - 221341 - 06/08

sanofi aventis

L'essentiel c'est la santé.

Copyright 2008- La revue du Praticen